



Гиперплазия

Миома

Эндометриоз

Женские проблемы

Почему миома и эндометриоз так актуальны сегодня?

- От 10 до 45% женщин, в возрастной группе 30-40 лет, страдают этими заболеваниями.
- Миома значительно «помолодела» – диагностируется у 5% молодых женщин (20-25 лет).
- В 1,5-5% случаев происходит злокачественное перерождение миомы.
- В 2% случаев отмечается сочетание миомы матки и рака эндометрия.





Миома и эндометриоз –

две разные гинекологические проблемы, связанные с маткой, имеющие общую причину. Это нарушение гормонального обмена, которое, в свою очередь, ведет к усиленному патологическому делению клеток.

Стенка матки

состоит из трех слоев:

Внутренняя оболочка – эндометрий

Мышечная оболочка – миометрий

Наружная оболочка – серозная

Миома матки –

узловое доброкачественное новообразование, которое появляется в мышечном слое стенки матки.

Эндометриоз –

доброкачественное разрастание ткани эндометрия, которое может находиться как в полости матки, так и за пределами.

Почему возникает миома и эндометриоз?

Основными факторами риска
данных заболеваний являются:

Миома

- Аборты
- Эндометриоз
- Гормональные нарушения
- Заболевания сердечно-сосудистой системы
- Железнодорожественная анемия
- Наследственная предрасположенность
- Избыточный вес
- Нарушение менструальной функции

Эндометриоз

- Особенности строения маточных труб
- Операции на матке (аборт, кесарево сечение и т.д.)
- Нарушение в иммунной системе
- Наследственная предрасположенность
- Нарушение обмена веществ
- Возраст 30-45 лет
- Уменьшение (увеличение) числа дней в менструальном цикле



Чем опасны эти заболевания?

- Бесплодие
- Внематочная беременность
- Самопроизвольный аборт, преждевременные роды
- Рождение узла и онкогенетический выворот матки
- Воспалительные процессы в миоматозной ткани
- Озлокачествление миомы
- Обильные менструальные кровотечения
- Анемия

Основными симптомами миомы и эндометриоза являются:

- Боли в нижней части живота перед менструацией
- Кровотечения или кровяные выделения между менструациями
- Нарушения менструального цикла
- Плохое самочувствие, слабость
- Боль при дефекации, мочеиспускании
- Запоры, частое или затрудненное мочеиспускание
- Болезненные ощущения при половом акте

Если Вы обнаружили у себя хотя бы некоторые из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Формула женского здоровья!

Ученые НИИ молекулярной медицины Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова разработали принципиально новый подход к решению проблем женского здоровья и создали Индинол® и Эпигаллат®

Индинол® и Эпигаллат®

содержат ряд активных компонентов, которые:

- Останавливают рост миомы матки
- Способствуют уменьшению очагов эндометриоза
- Нормализуют гормональный баланс, восстанавливают соотношение метаболитов эстрогенов




Негормональные
средства

Индинол® и Эпигаллат® рекомендуются:

- В составе комплексной терапии на ранней стадии миомы матки, эндометриоза и мастопатии
- При противопоказаниях к гормональной терапии
- После хирургического лечения миомы и эндометриоза

Схема приема:



ILMIX GROUP
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

www.ilmixgroup.ru

ЗАО «ИльмиксГрупп»
121248, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 721-20-58

ПОЗВОНИ, узнай больше
по телефону горячей линии:

8-800-555-8-800

Звонки по России бесплатно

www.indinol.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.